Syngenta Bioline España
C/ Jazminero, 1. Edif. Guay. Ofic. 3
04720 Aguadulce - Almería
Tel. 950-348711 Fax. 950-343102
Bioline.spain@syngenta.com

Placas cromotrópicas y Rollos de captura

PARA EL MUESTREO Y CAPTURA DE PLAGAS

Syngenta Bioline dispone, además de los organismos auxiliares, de otros productos muy útiles para el muestreo y captura de plagas, especialmente dentro de Programas de Manejo Integrado de Plagas/Cultivo (ICM).

Características del producto

Las placas cromotrópicas son una herramienta esencial para hacer el seguimiento de la evolución de las plagas en invernaderos / parcelas de cualquier cultivo y así poder ajustar mejor el momento adecuado para las intervenciones fitosanitarias y/o la introducción de organismos auxiliares.

En los invernaderos la colocación de placas o rollos engomados amarillos o azules, al principio del cultivo en una densidad suficiente, constituye un complemento muy importante (barrera física) a los tratamientos químicos e insectos auxiliares, contribuyendo también a la reducción de la incidencia de virus transmitidos por insectos en aquellos cultivos susceptibles.



Presentación y descripción

Tanto **Trapline y/b** como **Takitrapline y/b** se presentan en unidades de 20 placas de 22,5 X 40 cm. Estas ultimas están provistas de un papel de protección adherido a las mismas y dividido en 5 bandas que se retiran por separado.

Los rollos de captura **(Trapline yr/br)** tienen unas dimensiones de 100 m de longitud por 30 cm de ancho.

Aplicaciones

Las placas cromotrópicas y rollos engomados amarillos capturan principalmente moscas blancas, esciáridos, pulgones y minadores, mientras que las azules son más selectivas para trips (especialmente aconsejadas en cultivo de pimiento).

Dosis y modo de empleo

Trapline y / Trapline b

Las **placas de captura** se utilizarán a razón de 20-30 por cada 1000 m^2, localizándose principalmente bajo las aperturas de ventilación y en las bandas, y de forma general donde el riesgo de invasiones de insectos plaga sea mayor.

Takitrapline y / Takitrapline b

Las **placas** cromotrópicas utilizadas **para muestreo (placas de monitoreo)** se colocan a razón de 2-5 placas de cada color por parcela o invernadero, en las zonas de mayor riesgo de entrada de plagas. Semanalmente, o con la frecuencia que se estime oportuna, se retirará una de las bandas de papel adheridas a la placa, para observar la evolución de las capturas de forma periódica.

Trapline yr / Trapline br

Se recomienda la colocación de los rollos engomados de captura en la banda de los invernaderos, a la altura de las ventilaciones laterales, así como debajo de las ventilaciones cenitales.

Para más información consultar con el Dpto. técnico de Syngenta Bioline.

© Syngenta Bioline España / Hojas técnicas 2007